

# Bệnh tụ huyết trùng gia cầm (bệnh toi)



**NGUYÊN NHÂN:** Do vi khuẩn *Pasteurella multocida* gây ra. Tất cả gia cầm đều mắc cảm với bệnh. Gà tây cảm thụ với bệnh hơn gà rồi đến vịt, ngỗng, quạ, chim sẻ, chim sáo,... Gà lớn mắc cảm hơn gà nhỏ.

## **TRIỆU CHỨNG:**

- Thời gian nung bệnh ngắn, khoảng 1-2 ngày nhưng có khi tới 4-9 ngày. Gồm 2 thể cấp tính và mãn tính.

### **- Thể cấp tính:**

- + Thường triệu chứng chỉ xuất hiện vài giờ trước khi chết.
- + Sốt cao ( $42-43^{\circ}\text{C}$ ), bỏ ăn, xù lông, chảy nước nhớt từ miệng, nhịp thở tăng.
- + Phân tiêu chảy có nước màu hơi trắng sau đó trở nên hơi xanh lá cây và có chứa chất nhầy.
- + Gà chết có biểu hiện mào và tích tím bầm do ngạt thở.

### **-Thể mãn tính:**

- + Gà ốm, sưng phồng tích, khớp xương chân, xương cánh, đệm của bàn chân.
- +Thỉnh thoảng có tiếng rale khí quản và khó thở. Gà có thể bị tật vẹo cổ

## **BỆNH TÍCH:**

### **a.Thể cấp tính**

- Sung huyết, xuất huyết ở tổ chức liên kết dưới da, cơ quan phủ tạng nhất là phần bụng: tim, lớp mỡ vành tim, phổi, lớp mỡ xoang bụng, niêm mạc đường ruột.
- Viêm bao tim tích nước.
- Gan sưng có hoại tử bằng đầu đinh ghim.
- Chất dịch nhầy có nhiều ở cơ quan tiêu hóa như hầu, điều, ruột.

- **Buồng trứng:** nang noãn trưởng thành mềm, nâu, không quan sát được mạch máu. Đôi khi quan sát thấy lòng đỏ vỡ chảy vào xoang bụng làm viêm phúc mạc. Nang chưa thành thực thì sung huyết.

**b.Thể mãn tính:**

- Viêm phúc mạc, ống dẫn trứng, khớp có dịch fibrin.
- Sung màng tiếp hợp mắt và mắt.
- Có thể viêm não tủy làm vẹo cổ





## **BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH:**

### **\* Phòng bệnh:**

- Vệ sinh sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng 1 trong 2 chế phẩm **PIVIDINE** hoặc **ANTIVIRUS-FMB**.

- Bổ sung vitamin **B.COMPLEX-C**: 5g/1kg thức ăn hoặc **ELECTROLYTE**: 1g/2 lít nước uống giúp tăng cường sức đề kháng, chống stress khi môi trường thay đổi.

- Tiêm phòng vaccin cho gia cầm.

- Trộn kháng sinh vào thức ăn hoặc nước uống để phòng bệnh:

+**TETRA-COLIVIT**: 2g/1lít nước uống.

+**FLORFEN-B**: 4g/1 lít nước uống

### **\* Điều trị:**

- Dùng 1 trong các sản phẩm chứa kháng sinh sau để điều trị bệnh:

+**TETRA-COLIVIT**: 2g/1lít nước uống

+**FLORFEN-B**: 8g/1 lít nước uống

- Kết hợp dùng vitamin **B.COMPLEX-C**: 5g/1kg thức ăn hoặc **ELECTROLYTE**: 1g/2 lít nước uống để tăng sức kháng bệnh, mau phục hồi sức khỏe.

- Trong thời gian điều trị bệnh, tiến hành sát trùng chuồng trại ngày 1-2 lần bằng 1 trong 2 chế phẩm **PIVIDINE** hoặc **ANTIVIRUS-FMB**.

*Đơn vị thực hiện: Chợ Nông nghiệp*